

香港心臟專科中心



現有6個專科中心，由經驗豐富的專業醫療團隊，為病人提供各類心臟及心血管健康等的檢查、診斷、治療及手術服務。



涵蓋9+服務範圍



專科診症



冠狀動脈介入治療術
(通波仔)



植入心臟起搏器



心導管射頻消融術



24小時心電圖及
間歇性心電圖



24小時血壓監察



心臟電腦掃描



心臟超聲波



運動心電圖



香港心臟診斷中心

現有2個診斷中心，配置高端醫療設備，可為客人提供多項心臟檢查服務，包括：

- 1 低輻射及高速電腦掃描器
(西門子雙源CT及GE 256切面CT)
- 2 超聲波掃描
- 3 X光平片
- 4 其他心臟檢查儀器：心電圖、運動心電圖、心臟超聲波等



香港心臟專科中心
Hong Kong Cardiac Centre
香港心臟診斷中心
Hong Kong Cardiac Diagnostic Centre



專科中心地址

- 中環皇后大道中33號萬邦行2202-03室 2752 6232
- 佐敦彌敦道238號7樓705-707室 2710 8891
- 觀塘觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心16樓11B及12A室 2123 1060
- 沙田連城廣場2樓219號舖 2697 0128
- 元朗水車館街28號萬金中心31A, 31B, 32號舖 2598 0355
- 屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場21樓11室 2336 0708

診斷中心地址

- 尖沙咀北京道12A號太子集團中心7樓 2811 3389
- 佐敦彌敦道238號4樓408-410室樓 2673 3982

香港心臟專科中心
預約熱線(只限訊息聯絡)
5546 0983

香港心臟診斷中心
預約熱線(只限訊息聯絡)
9727 2197

thmd.townhealth.com

Town_Health_Medical

Town Health Medical

了解更多



心臟專科
影片資訊




此單張只供本醫療中心病人閱覽

心臟早搏 PREMATURE BEAT



“早搏(異位搏動)是什麼?”

- 早搏是心臟提前跳動，意思指在正常兩下心跳之間，突然提前早出現了1下心跳
- 心臟早搏是比較常見的一類心律失常
- 常見於正常人，特別是老年人，通常為良性
- 5%左右的正常人可發生過早搏動



香港心臟專科中心
Hong Kong Cardiac Centre
香港心臟診斷中心
Hong Kong Cardiac Diagnostic Centre

IS_MIND_202210_027

早搏的分類

- 根據發放衝動的部位不同可分為房性早搏和室性早搏
- 起源於心房的為房性早搏，起源於心室的為室性早搏
- 其中以室性最多見，其次為房性

房性早搏



室性早搏



早搏的原因

早搏可以在正常人中出現比如：



情緒不穩、
神經緊張



喝咖啡、濃茶、
飲酒



可以沒有任何原因

任何一種心臟病，或影響心臟的疾病也會引起早搏：



甲狀腺功能亢進症



冠心病



心肌病

如果有早搏，需要擔心嗎？

若早搏（房性或室性）不是經常出現，對健康構成的威脅不大，通常為良性。但如果頻繁出現，可能會對心臟有產生一些的不良影響。

	房性早搏	室性早搏
頻繁定義	>6次/分鐘 或 30次/小時	每10下心跳1下早搏 (> 10%)
影響	可能是 心房顫動的前奏	可能導致心臟排水量 降低，令腦部供 血不足，可引致 乏力、頭暈及 胸悶，最嚴重的 可使患者心臟衰竭

早搏的症狀

- 早搏的患者可以毫無症狀
 - 脈搏觸診時發現心律不齊
 - 血壓計出現心律不齊的顯示然後救醫
 - 在例行身體檢查中的心電圖發現
- 患者可能會感覺到明顯心臟跳動，又或者感到心臟有一下沒跳動
- 可能會出現緊張、焦慮及慌張等情緒
- 頻發的早搏可致心力衰竭(因心排水量減少引起)導致氣促、乏力、頭暈等症狀



氣促



乏力



頭暈

早搏的診斷方法

醫生或會安排下列檢測：

- 靜態心電圖**：心電圖對早搏有診斷意義
- 心臟超聲波**：觀察是否有心臟結構上的病變(心房心室擴張，心臟收縮功能下降)
- 24小時持續性心電圖(動態心電圖)**：可詳細記錄早搏的類型，發生的多少，發生的規律，治療效果等
- 運動心電圖等**：評估早搏對運動的反應 某些心臟狀況會因運動而增加早搏負擔
- 心血管電腦掃描造影顯**：評估是否有冠心病



預防早搏的方法

- 要保持規律的生活及適當的體育鍛煉
- 要戒煙及避免大量飲酒，因為吸煙喝酒是引起冠心病的主要誘發因素
- 要保持情緒穩定，情緒高度緊張是引起功能性“早搏”的主要誘因
- 定期到醫院體檢，一旦發現心悸、早搏等情況要及時到醫院就診

早搏的治療方法

較輕微的患者

- 沒有或輕微徵狀
- 非頻繁的早搏
- 一般只會接受定期觀察及跟進
- 可先行嘗試減少過量攝取咖啡因看看情況有沒有好轉

較嚴重的患者

- 頻密徵狀
- 頻繁的早搏
- 可能需要考慮藥物治療或手術治療，以免心臟功能長遠會受損

手術治療

導管射頻消融手術

- 房性早搏一般不需要手術治療，主要針對室性早搏
- 此手術主要透過射頻能量，將異常發出電流的細胞消融，從而改善早搏問題
- 手術成功率高達80%至90%，而手術死亡風險低於千分之一
- 但並非所有早搏患者都適合進行消融手術，例如引發異常電流的心臟位置多於兩處的患者，就不能接受



資料只供參考，如有任何疑問，請向您的醫生查詢。