

香港心臟專科中心

現有6個專科中心，由經驗豐富的專業醫療團隊，為病人提供各類心臟及心血管健康等的檢查、診斷、治療及手術服務。



香港心臟專科中心
Hong Kong Cardiac Centre
香港心臟診斷中心
Hong Kong Cardiac Diagnostic Centre



專科中心地址

中環皇后大道中33號萬邦行2202-03室	2752 6232
佐敦彌敦道238號7樓705-707室	2710 8891
觀塘觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心16樓11B及12A室	2123 1060
沙田連城廣場2樓219號舖	2697 0128
元朗水車館街28號萬金中心31A, 31B, 32號舖	2598 0355
屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場21樓11室	2336 0708

診斷中心地址

尖沙咀北京道12A號太子集團中心7樓	2811 3389
佐敦彌敦道238號4樓408-410室樓	2673 3982

香港心臟專科中心
預約熱線(只限訊息聯絡)

5546 0983



香港心臟診斷中心
預約熱線(只限訊息聯絡)

9727 2197



thmd.townhealth.com

Town_Health_Medical

Town Health Medical

了解更多



心臟專科
影片資訊



此單張只供本醫療中心病人閱覽



香港心臟專科中心
Hong Kong Cardiac Centre
香港心臟診斷中心
Hong Kong Cardiac Diagnostic Centre

涵蓋9+服務範圍



專科診症



冠狀動脈介入治療術
(通波仔)



植入心臟起搏器



心導管射頻消融術



24小時心電圖及
間歇性心電圖



24小時血壓監察



心臟電腦掃描



心臟超聲波



運動心電圖



香港心臟診斷中心

現有2個診斷中心，配置高端醫療設備，可為客人提供多項心臟檢查服務，包括：

- 1 低輻射及高速電腦掃描器
(西門子雙源CT及GE 256切面CT)
- 2 超聲波掃描
- 3 X光平片
- 4 其他心臟檢查儀器：心電圖、運動心電圖、心臟超聲波等



什麼是昏厥/昏倒？

昏厥/昏倒主要是因為腦部的血流不足，造成大腦暫時失去功能。正常來說，失去意識通常幾秒鐘或幾分鐘後就會自動甦醒。

什麼是迷走神經性昏厥？

迷走神經性昏厥是反射調節性昏厥的其中一種。

迷走神經支配大部份呼吸系統、消化系統和心臟等器官的運動、感覺及腺體分泌，當受到刺激時，心跳會變慢、血壓降低，血液進入腦部的量會顯著降低，患者常會視力模糊，眼前一黑，接著失去意識。而且各年齡層都可能發生，但多發生在年輕女性身上。

其他反射調節性昏厥

- 情況性昏厥是上廁所、吞嚥或用力咳嗽導致的暈倒
- 頸動脈竇過度敏感受到壓力刺激會影響到心跳導致暈倒，常發生在按摩頸部位時

迷走神經性昏厥的誘發因子



受到驚嚇、情緒緊繃
(常見的因素是看到血、
抽血打針時)



炎熱、疲勞、
站太久



突發疼痛
(例如肚痛、經痛)

迷走神經性昏厥的徵狀預告

- 先出現頭暈，冒冷汗，臉色發白，甚至出現耳鳴的不舒服狀況
- 接著視力模糊、眼前一黑
- 但只要坐下、躺下便會逐漸恢復

其他引起昏厥的重要原因

！ 需要注意或排除

心因性昏厥

- 心臟無法打出充足的血液供應腦部所需，因此造成昏厥
- 常見的疾病有：心律不整造成心跳太快或太慢、或心結構上的疾病比如說心臟瓣膜狹窄，這時昏倒就會是重要的前兆，必須盡快治療

自律神經功能不全，造成姿勢性低血壓

- 這類昏厥常發生在有糖尿病、腎病、退化性疾病(如：巴金森氏症)
- 這些病人的末梢血管容易發生病變，當改變姿勢時(坐著、躺著或蹲下時)，突然起身會導致血液無法回到腦部，就會導致頭暈目眩或昏厥

預防迷走神經性昏厥

- ✓ 日常盡量避免站立時間過長、脫水等即可
- ✓ 建議平時養成多喝水和運動的習慣

迷走神經性昏厥的診斷方法

臨床症狀評估

會根據病人昏倒前的症狀、發生的頻率、多久後醒來，以及什麼情況下昏倒(比如突發疼痛、改變姿勢、如廁後)、有無相關疾病，也會根據一些檢查來判斷患者到底是什麼原因引發昏倒：

常用檢查

靜態心電圖

：評估是否有高度房室傳導阻滯

24小時持續性心電圖

：評估是否有心律不整造成心跳

(動態心電圖)

太快或太慢

心臟超聲波

：觀察是否有心臟結構上的病變如心臟瓣膜狹窄

傾斜床測試

：可以幫助診斷姿勢性低血壓

患者平躺在可控制傾斜角度的檢查床上10分鐘，持續監測心律及血壓，接著將床往上傾斜60度(頭高腳低)，觀察是否產生症狀

一般人採這個姿勢血壓會上升，但有姿勢性低血壓者血壓反而會往下掉

注意



如果昏倒太頻繁、沒有明顯誘發因子，而且醒來後還是感到身體不適，包含胸痛、呼吸不順等，或原本就有高血壓、糖尿病等可能引起心臟疾病者，就要注意是否有其他重大原因引起昏倒。

治療迷走神經性昏厥

一般而言，常見的迷走神經性昏厥是良性的，通常平躺休息後就會醒來，沒有生命危險，不需要特別治療。

當出現暈眩徵兆時，病人可將雙腿交叉站立，雙手互扣向外拉，並咬緊牙關，這樣可提高血壓，避免暈倒。